

Математически турнир „Иван Салабашев“, 2013 г.

Решения на задачите от темата за 6. клас

1. Изразът $\frac{(4^2)^3 \cdot 5^7}{10^{12}}$ е равен на:

- А) $\frac{1}{10^7}$ Б) $\frac{1}{5^7}$ В) $\frac{1}{5^5}$ Г) $\frac{2^5}{5^7}$


Отговор: В.

2. За дробите $A = \frac{2013}{2012}$ и $B = \frac{201400002014}{201300002013}$ е вярно, че:

- А) $A > B$ Б) $A < B$ В) $A = B$ Г) $A = 3B$

Отговор: А. Тъй като $B = \frac{201400002014}{201300002013} = \frac{2014}{2013}$ и $2013^2 > 2012 \cdot 2014$, то $A > B$.

3. Върху бял квадратен лист са поставени два сиви правоъгълни листа с обиколки 52 см и 28 см, както е показано на чертежа. Сивите листи се припокриват и общата им част е квадрат с обиколка, равна на страната на белия квадрат. Колко сантиметра е страната на белия квадратен лист?



- А) 16 Б) 20 В) 18 Г) 12

Отговор: А. Сборът от обиколките на двата правоъгълника е равен на сбора от обиколките на двата квадрата. Следователно $52 + 28 = 5x$, откъдето $x = 16$.

4. Ако $a \diamond b = \frac{a+b}{a-b}$ и $(3 \diamond x) \diamond 2 = 0$ на колко е равно числото x ? А) 9 Б) 7 В) 5 Г) 3

Отговор: А. Имаме $(3 \diamond x) \diamond 2 = \frac{3+x}{3-x} \diamond 2 = \frac{\frac{3+x}{3-x} + 2}{\frac{3+x}{3-x} - 2}$, откъдето $\frac{3+x}{3-x} + 2 = 0$. Оттук намираме $x = 9$.

5. В два чувала има съответно a и b кг. захар. Известно е, че $a - b$ е равно на $2a$ процента от b и на a процента от a . На колко е равно $a + b$? А) 50 Б) 75 В) 100 Г) 125

Отговор: Б. От условието следва, че $\frac{2a}{100} \cdot b = \frac{a}{100} \cdot a = a - b$. От първото равенство намираме $a = 2b$ и след заместване във второто равенство получаваме $b = 25$. Тогава $a = 50$ и $a + b = 75$.

6. Иван е x пъти по-малък от брат си, а преди една година той бил $x + 1$ пъти по-малък от брат си. Ако сборът от годините на Иван и брат му е 30, на колко години е Иван? А) 10 Б) 4 В) 5 Г) 6

Отговор: В. Ако годините на Иван са a , то годините на брат му са ax и $a + ax = 30$. От условието имаме $(x + 1)(a - 1) = ax - 1$, откъдето $ax - x + a - 1 = ax - 1$, т.е. $x = a$. Тогава $a + a^2 = 30$ и значи $a = 5$.

7. В кутия има 7 червено-зелени, 6 зелено-сини и 5 синьо-червени топки. Какъв най-малък брой топки трябва да извадим от кутията без да гледаме, че да сме сигурни, че някой цвят ще се среща на поне 5 топки?

- А) 5 Б) 6 В) 7 Г) 8

Отговор: В. Ако a , b и c са топките от съответните видове, то при $a = b = c = 2$ нямаме цвят върху 5 топки. Ако $a + b + c = 7$, то поне един от сборовете $a + b$, $b + c$ и $a + c$ е поне 5 и следователно има цвят върху 5 топки.

8. С цифрите 6, 7, 8 и 9 е съставено четирицифрено число, като всяка цифра е използвана само веднъж. Ако това число се дели на $2^a \cdot 3^b$, най-много колко е $a + b$?

А) 4 Б) 5 В) 6 Г) 7

Отговор: В. Тъй като $6 + 7 + 8 + 9 = 30$, то всяко число от дадения вид се дели на 3, но не се дели на 9, т.е. $b = 1$. Тъй като търсим най-голямата степен на двойката, съставяме тези числа, които се делят на 8. От признаците за делимост на 4 и 8 следва, че кратните на 8 числа са 8976, 7896, 7968, 9768. От тях числото, което се дели на най-голяма степен на 2, е $7968 = 32 \cdot 249$, т.е. $a = 5$ и $a + b = 6$.

9. Ирина написала на един лист естествените числа от 1 до n . Теодора изтрила от листа числата, които се делят на 3 и числата, които се делят на 5. Останали 241 числа. Колко е n ?

А) 439 Б) 445 В) 451 Г) 457

Отговор: В. От 1 до 15 се изтриват $15 : 3 = 5$ кратни на 3 числа, $15 : 5 = 3$ кратни на 5 числа, като числото 15 попада и в двете групи. Следователно са изтрети $5 + 3 - 1 = 7$ числа и останали $15 - 7 = 8$ числа. Тъй като $241 = 30 \cdot 8 + 1$, то $n = 30 \cdot 15 + 1 = 451$.

10. В училището Хогоуртс постъпили два пъти повече момчета, отколкото момичета. Разпределителната шапка изпратила в Грифиндор 25% от момичетата и 20% от момчетата, общо нови 39 ученици. Колко деца постъпили в Хогоуртс?

А) 120 Б) 144 В) 180 Г) 240


Отговор: В. Ако момичетата са y , то момчетата са $x = 2y$. Тогава $\frac{1}{4}y + \frac{1}{5}2y = 39$, откъдето $y = 60$. Учениците са $x + y = 3y = 180$.

11. В турнир по футбол участвали 6 отбора, като всеки два отбора изиграли точно една среща. В крайното класиране първите три отбора събрали по a точки всеки, а последните три отбора събрали по b точки всеки, като $a > b$. Колко различни стойности може да приема сбора $a + b$?

Отговор: 5. Общо са изиграни 15 срещи и следователно всички отбори са събрали общо между 30 и 45 точки. Тогава $30 \leq 3(a + b) \leq 45$ или $10 \leq a + b \leq 15$. Ако $a + b = 10$, то всички срещи са завършили наравно и всички отбори имат по 5 точки, противоречие. При $a + b = 11, 12, 13, 14, 15$ лесно се построяват примери на турнири с исканото свойство.

12. На чертежа четириъгълникът $MATH$ е построен в квадратна мрежа. Точките W и S са средите на страните MH и HT съответно. Колко квадратни сантиметра е лицето на четириъгълника $WASH$?

Отговор: 17. Лицето на четириъгълника $MATH$ е $60 - 8 - 4 - 8 - 6 = 34$ кв.см. Лицето на $WASH$ е половината от лицето на $MATH$, т.е. 17 кв.см.



13. Правоъгълен лист е разрязан с ножици на две по права линия. След това едно от двете парчета отново е разрязано на две и т.н. общо са направени 10 разрязвания. Ако едно от получените парчета е 14-ъгълник, колко от получените парчета са триъгълници?

Отговор: 10. При всяко разрязване броят на върховете на многоъгълника с най-много върхове се увеличава най-много с 1 (това става когато разрезът се направи между две точки върху две съседни страни на разрязвания многоъгълник). Това означава, че след 10 разрязвания многоъгълникът с максимален брой върхове има най-много 14 върха. Следователно всички

останали многоъгълници са триъгълници и понеже общо са получени 11 многоъгълника (всяко разрязване увеличава броя на парчетата с 1), то имаме 10 триъгълника.

14. В таблица 3×3 са записани цифрите $1, 2, 3, \dots, 9$, като всяка цифра е записана по един път. Сборът на числата във всеки квадрат 2×2 е втора степен на естествено число. Кое е числото, записано в квадратчето със $*$?

2	1	6
*		

Отговор: 3. Нека числата са

2	1	6
a	b	c
x	y	z

. Понеже $1 + 2 + 3 + 4 = 10$ и $9 + 8 + 7 + 6 = 30$, то

сборът на числата във всеки квадрат 2×2 е 16 или 25. Тогава $a + b = 13$ и $x + y = 12$ (защото $x + y > 3$). Освен това $b + c = 9$ (защото $b + c < 18$) и лесно се вижда, че $y + z = 16$. От горните

равенства се получава и решението

2	1	6
8	5	4
3	9	7

.

15. Оцветени са a от върховете на куб така, че върху всяка стена оцветените върхове са нечетен брой. За колко различни стойности на a може да се направи това?

Отговор: 3. Две успоредни стени на куба съдържат всичките му върхове, а от условието следва, че върху тях има общо четен брой избрани върхове. Следователно $a = 2, 4, 6$ или 8. При $a = 8$ трябва да изберем всички върхове, което противоречи на условието върху всяка стена да са избрани нечетен брой върхове. За всеки от случаите $a = 2, 4, 6$ лесно се построява пример със съответния брой върхове.

Задачите от тази тема са предложени от **Емил Колев**.